

## 10% URYDYNOWA MAŚĆ I PASTA

Farmaceuta kliniczny Jurgen Barth z Kliniki Uniwersyteckiej w Essen, opracował i rozwinął „antidotum” na dłoniowo-podeszwową erytrodisthesję wywołaną przez 5-FU we wlewie lub jego doustne pochodne (capecitabina, tegafur-uracil).

### Konsultacja:

**Jurgen Barth:** Uridin-Hand-Fußsalbe und Uridin-Haftpaste als effektive Antidota nach akzidenteller Hautkontamination mit 5-Fluorouracil – ein Fallbericht.  
Krankenhauspharmazie 2000; 21: 625-628.

### **Rp. 10% Urydynowa maść do rąk i stóp**

100g zawiera:	Uridin	10g
	Parafina ciekła	q.s.
	Basiscreme DAC	ad 100g

#### **Wykonanie:**

uridin rozproszyc w parafinie do rozpuszczenia, nastepnie dodawac stopniowo Basiscreme DAC ad 100g.

### **Rp. 10% Urydynowa pasta przylepna (na błonę śluzową j. ustnej)**

10g zawiera:	Uridin	1g
	Parafina ciekła	6,65
	Carbopol 974P	2,35
	Ol.Menthae	1gtt.

#### **Wykonanie:**

uridin rozproszyc w parafinie do rozpuszczenia, nastepnie stopniowo wprowadzic Carbopol 974P, na koniec Ol.Menthae.