

PREPORUKE ZA TRANSPORT VISOKO TOKSIČNIH LIJEKOVA

Lijekovi koji imaju CMR (kancerogeni, mutageni i/ili teratogeni) toksičnost, poput citotoksičnih, antivirusnih visoko učinkovitih lijekova zahtjevaju posebnu pažnju prilikom rukovanja. Zbog tih razloga, ESOP savjetuje ljekarnicima da uključe ove preporuke u svoj postupnik, kako bi se povećala sigurnost i da traže dobavljače sljedeće informacije:

- Karakteristike i vrsta bočica kako bi se izbjegao lom (npr. plastika)
- Postupnik za rukovanje kako bi se izbjeglo vanjsko zagađenje (primjer: čišćenje, zamatanje izvana, itd.).

ESOP preporuča metode sigurne dostave lijekova prema Quapos smjernicama (www.esop.eu) i inzistira na sljedećim stavkama:

- Dostava se mora izvršiti u osiguranim, nepropusnim zatvorenim kutijama (ne u kartonskim kutijama).
- Dostava ovih lijekova mora biti odvojena od ostatka narudžbe.
- Označavanje sadržaja mora biti čitljivo i mora se nalaziti na vanjskoj ambalaži te sadržavati:
 - Oznaku koja upozorava na opasnost i koju može razumjeti i prepoznati svatko.
 - Tekst koji označava:
 - f Da se mora izbjegavati svaki kontakt i postupnik u slučaju da dođe do kontakta;
 - f Kome se treba javiti u hitnom slučaju ako dođe do kontaminacije;
 - f Trudnice i dojilje ne smiju ni u kom slučaju doći u kontakt sa ovim proizvodima.
 - ! Izrazi upotrebljeni u tekstu moraju biti jednostavnii i lako razumljivi svakome.
 - ! Tekst mora biti napisan na lokalnom jeziku pošiljatelja i naručitelja. Ako roba prelazi granicu, treba prevesti tekst na barem još jedan strani jezik.
- Paketi sa vidljivim oštećenjima moraju se odmah staviti u karantenu i kontaktirati dobavljača. Ne savjetuje se da se oštećene lagene šalju natrag dobavljaču, već bi se trebale uništiti prema propisima.

Primjer

Eviter tout contact avec le produit		Izbjegavajte bilo kakav kontakt s proizvodom
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau froide uniquement pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin ou un ophtalmologue sans délai.		U slučaju kontakta s očima i/ili kožom, dobro ispirite hladnom vodom najmanje 10 minuta i konzultirajte se odmah s liječnikom ili oftalmologom.
En cas de casse, ne pas toucher et contacter +... /....		U slučaju razbijanja i proljevanja, ne dirajte sadržaj bez zaštite +... /....
Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent ni manipuler ni entrer en contact avec ces produits.		Trudnice i dojilje moraju izbjegavati kontakt sa ovim lijekovima.

ESOP zahvaljuje svim partnerima koji sudjeluju u unapređivanju sigurnosti.