



RACCOMANDAZIONI PER IL TRASPORTO DI FARMACI ALTAMENTE ATTIVI

I prodotti che hanno una tossicità CMR (cancerogena, mutagena e/o riproduttiva), come i citotossici e gli antivirali, sono farmaci molto potenti e devono quindi essere maneggiati con cautela. Per queste ragioni L'ESOP raccomanda ai farmacisti di includere nei capitolati di gara dei criteri di qualità, volti a migliorare la sicurezza, che richiedano ai fornitori:

- L'impiego di flaconi che evitino o contengano le rotture (ad esempio: uso di materiale plastico)
- Indicazione delle procedure utilizzate per evitare contaminazioni esterne (esempi: metodi di pulizia, modalità di contenimento dell'involucro esterno, verifica di livello dei residui etc.).

ESOP raccomanda modalità di consegna sicura in accordo con le linee guida QUAPOS (www.esop.eu), con particolare attenzione ai seguenti punti:

- La consegna deve essere effettuata in casse sigillate, a prova di perdite (non scatole di cartone).
- Negli ordini multipli, i farmaci CMR devono essere consegnati separatamente dal resto.
- La confezione esterna deve chiaramente indicare il contenuto interno e vanno previsti:
 - Un logo che indichi il pericolo, con un'avvertenza facilmente comprensibile anche da una persona non formata.
 - Un testo che indichi:
 - ✓ Di evitare contatti con il contenuto interno;
 - ✓ Quali misure adottare in caso di contatto accidentale;
 - ✓ A chi rivolgersi in caso di emergenza per una eventuale contaminazione accidentale;
 - ✓ Che le donne in gravidanza e in allattamento non devono in nessun caso maneggiare o entrare in contatto con tali prodotti.
 - La terminologia impiegata deve essere semplice, per essere compresa da tutti.
 - Il testo deve essere scritto nella lingua in uso nell'area del mittente e di chi riceve. Se le merci attraversano più frontiere linguistiche, va considerata la necessità di aggiungerne altre.
- I pacchi con segni visibili di danneggiamento devono essere immediatamente messi in quarantena e deve essere contattato il fornitore. Non è consigliabile restituire i prodotti danneggiati al fornitore, ma tutto il pacco andrebbe smaltito secondo normativa vigente per i citotossici.

Esempio di etichetta

<p>Eviter tout contact avec le produit En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau froide uniquement pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin ou un ophtalmologue sans délai. En cas de casse, ne pas toucher et contacter +.. /.... Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent ni manipuler ni entrer en contact avec ces produits.</p>	 <p>Medicinale altamente attivo, manipolare con attenzione Medicament hautement actif à manipuler avec précaution</p>	<p>Evitare qualsiasi contatto con il prodotto. In caso di contatto con gli occhi e/o la pelle sciacquare abbondantemente con acqua fredda per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico oculista. In caso di fuoriuscita o danneggiamento, non toccare e contattare immediatamente +.. /.... Deve essere evitata qualsiasi manipolazione nelle donne in gravidanza o allattamento.</p>
---	--	--

ESOP ringrazia tutti i partner che partecipano ai miglioramenti nella sicurezza.