

IETEIKUMI ĪPAŠI SPĒCĪGAS IEDARBĪBAS MEDIKAMENTU TRANSPORTĒŠANAI

Preparāti ar CMR (kancerogēnu, mutagēnu un/vai reproduktīvo sistēmu) toksicitāti, piemēram, citotoksiskie līdzekļi, pretvīrusu līdzekļi - ir ļoti spēcīgas zāles, tāpēc ar tām jārikojas piesardzīgi. Šo iemeslu dēļ ESOP iesaka farmaceitiem savās zāļu iepirkumu specifikācijās iekļaut kritērijus, kuru mērķis ir uzlabot drošību lūdzot piegādātājiem sniegt šādu informāciju:

- Pudules raksturlielumi, lai izvairītos no plīsumiem (piemēram, plastmasa)
- Procedūras, ko izmanto, lai izvairītos no ārēja piesārņojuma (piemēri: tīrīšana, ārējā iesaiņošana, neizlietojamais atlikums utt.)

ESOP iesaka drošas piegādes metodes saskaņā ar Quapos vadlīnijām (www.esop.eu) un uzstāj uz šādu punktu izpildes:

- Piegādei jābūt nodrošinātiem hermētiski noslēgtiem konteineriem (nevis kartona kastēm).
- Atsevišķa piegāde no pārējā pasūtījuma.
- Satura marķējums ir skaidri redzams no iepakojuma ārpusē un sastāv no:
 - Logotipa, kas norāda uz bīstamību, ar brīdinājumu, ko var viegli saprast pat neapmācīta persona.
 - Teksts, kas norāda, ka:
 - Jāizvairās no jebkāda kontakta un kādi pasākumi ir jāveic kontakta gadījumā;
 - Ar ko sazināties ārkārtas gadījumos saistībā ar piesārņojuma jautājumiem;
 - Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, nekādā gadījumā nedrīkst rīkoties vai nonākt saskarē ar šādiem produktiem.
 - Terminiem ir jābūt vienkāršiem, lai tos saprastu visi.
 - Tekstam jābūt rakstītam valodā, kurā runā pasūtītāja un piegādātāja reģionā. Ja preces šķērso vairāku valstu robežas, ir jāapsver citu valodu pievienošana.

• Iepakojumi ar vizuālām bojājumu pazīmēm nekavējoties jāievieto karantīnā un jāsazinās ar piegādātāju. Bojātos citotoksiskos flakonus nav ieteicams atdot atpakaļ piegādātājam, tā vietā tie atbilstoši jāiznīcina.

ESOP pateicas visiem partneriem, kas piedalās drošības uzlabošanā

Rekomendācijas apstiprināja ESOP delegāti

Koordinatori : Monique Ackermann



Izvairieties no jebkādas saskares ar medicīnisko produktu.

Ja līdzeklis nonācis acīs un/vai tieši uz ādas, rūpīgi skalojiet ar aukstu ūdeni vismaz 10 minūtes un nekavējoties sazinieties ar ārstu vai oftalmologu.

Ja medikaments ir izplūdis vai iepakojums ir bojāts, tam nepieskarieties, bet nekavējoties piezvaniet pa tālruni +

Grūtnieces un sievietes zīdīšanas periodā jāvairās no saskares ar šo līdzekli."