

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU LEKÓW WYSOKIEGO RYZYKA

Produkty lecznicze wysokiego ryzyka (rakotwórcze, mutagenne i/lub mające toksyczny wpływ na układ rozrodczy), takie jak leki cytotoksyczne, leki przeciwwirusowe, należą do leków bardzo silnie działających, dlatego też należy z nimi postępować ze szczególną ostrożnością.

W związku z powyższym ESOP zaleca, aby farmaceuci przy rozpatrywaniu ofert od dostawców uwzględnili kryteria mające na celu poprawę bezpieczeństwa dostaw, prosząc o dostarczenie następujących informacji:

- Właściwości fiolki zapobiegające stłuczeniu (np. plastik),
- Procedury stosowane w celu zapobiegania zewnętrznego skażenia fiolek (np. czyszczenie, pakowanie wtórne, poziomy pozostałości itp.).

ESOP zaleca bezpieczny transport produktów leczniczych wysokiego ryzyka, zgodnie z wytycznymi Quapos (www.esop.eu), a w szczególności:

- Dostawa musi odbywać się w hermetycznych i wodoszczelnych opakowaniach (nie w kartonowych).
- Oddzielna dostawa produktów leczniczych wysokiego ryzyka od pozostałych leków.
- Etykieta opakowania wtórnego musi być czytelna i zawierać:
 - Logo informujące o zagrożeniu z ostrzeżeniem łatwo zrozumiałym, nawet dla osoby nieprzeszkolonej.
 - Tekst, który wskazuje:
 - Należy unikać kontaktu z produktem, a jeśli do tego dojdzie, podjąć odpowiednie środki
 - Dane kontaktowe w sytuacjach awaryjnych
 - Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny mieć kontaktu z produktem
 - ! Użyte terminy muszą być proste, aby każdy mógł je zrozumieć.
 - ! Tekst musi być napisany w języku nadawcy i odbiorcy. Jeśli produkty dostarczane są do innych regionów językowych, należy rozważyć ich dodanie.
- Opakowania z widocznymi oznakami uszkodzenia należy natychmiast poddać kwarantannie oraz skontaktować się z dostawcą. Nie zaleca się zwracania do dostawcy uszkodzonych fiolek z lekiem cytotoksycznym, lecz należy je zutylizować lokalnie, zgodnie z obowiązującą procedurą.

Przykład etykiety



Unikać jakiegokolwiek kontaktu z produktem

W przypadku kontaktu z oczami i / lub skórą, przemywać dokładnie zimną wodą przez co najmniej 10 minut i następnie natychmiast skontaktować się z lekarzem albo okulistą.

W przypadku wycieku albo uszkodzenia, nie dotykać i natychmiast skontaktować się z +48/... ..

Kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz dorastająca młodzież nie powinny mieć kontaktu z produktem.

ESOP dziękuje wszystkim partnerom, którzy biorą udział w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa.