

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete ennetamine ja leevendamine

Võtke kohe selts ühendust oma arstiga, kui märkate

Lisainfo

Kontaktnumber



Esmabinumber: 112

Version 1, 2024



PATSIENDI INFOLEHT

Patsiendi nimi _____

Ravimi nimi _____

Kuupäev _____

Hoiatus: see infoleht sisaldab ainult kõige olulisemat teavet selle ravimi kohta ja on mõeldud lisana ametlikele infoallikatele. Vaatamata hoolikale kontrollile ei garanteerita teabe õigsust ja täielikkust ning ei vastutata vigade või kahjustuste eest.

Miks ravimit kasutada?


Kuidas ravimit kasutada?


- Patsiendina olete ravimeeskonna oluline liige.
- Patsiendina vastutate, et võtaksite ravimi nii nagu on ette nähtud.
- Neelake ravimi klaasitäie veega. Ärge närige/ imege tabletti. Ärge avage/purustage seda.
- Võtke _____ tablett(i)/kapslit, mis sisaldavad _____ mg _____ kord(a) päevas:



am	6	7	8	9	10	11	12

pm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Võtke koos toiduga 

Võtke tühja kõhuga 

Vahe peab olema _____ h enne/ _____ h pärast sööki

Võtke ravimit iga päev

Võtke ravimit ainult järgmistel päevadel:

Lisainfo:

Mida teha, kui olete unustanud ravimi võtmata või kui oksendasite?

Ohutu käitlemine ja säilitamine



- Ärge poolitage ega purustage tabletti ega avage kapslit.
- Ärge võtke kahjustatud tablette/kapsleid.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ravimit ei tohi käidelda rasedad ega imetavad emad.
- Kehavedelike (näit. okse) käitlemine: kasutada puhastamiseks ühekordseid kindaid ning lappe ja visata need kasutatuna kindlalt suletud plastikkotis olmeprügi hulka.
- Säilitamine: Toatemperatuuril (max. 25°C)
 Külmas (2-8°C)
- Lisainfo:

Ettevaatusabinõud

- Ravim suurendab tundlikkust päikesekiirgusele.
- Ravim võib mõjutada sõidukijuhtimise võimet.
- Ärge kasutage ravimit, kui olete rase või toidate last rinnaga.
- Kui teie partner kasutab seda ravimit, peate rasestumise vältimiseks kasutama kondoomi.
- Ravim võib avaldada mõju teie viljakusele.



Koostoimed

Teistel ravimitel/toidulisanditel võivad olla koostoimed teie ravimiga. Rääkige oma arstile/apteekrile kõigest, mida praegu võtate, ja teavitage teda iga kord, kui saate uue ravimiresepti või ostate ise uue ravimi/rohulisandi.

- Ärge kasutage ravimit/toidulisandit, mis sisaldab naistepuna. Ärge tarvitage greipfruuti sisaldavaid toiduaineid.
- Ärge kasutage:

